

[Visualizza Immagine](#)

<b>Classe</b>	<i>Agaricomycetes</i>
<b>Ordine</b>	<i>Boletales</i>
<b>Famiglia</b> □	<i>Boletaceae</i>
<b>Genere</b>	<i>Caloboletus</i>
<b>Specie</b> □	<i>Caloboletus calopus</i>
Sinonimo	<i>Boletus calopus</i>
<b>Nome volgare</b>	Malefico
<b>Commestibilità</b>	Non Commestibile

Fungo comune in montagna e collina in tutti i boschi di castagno, faggio e abete dall'estate a fine autunno. E' un bellissimo boleto a pori gialli e carne amara, si riconosce da *B. radicans*, con cui condivide la carne amara, per il gambo di colore giallo.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 15 cm, da emisferico a convesso, sodo e carnoso. La **cuticola** è asciutta e vellutata di colore nocciola pallido. Il **imenoforo** con tubuli giallo-olivastri che virano al blu con il taglio, pori gialli, blu alla pressione. Il

**gambo**

robusto, sodo, giallo vivo all'apice, rosso in basso, ricoperto da un reticolo a maglie allungate con colore al fondo, misura dai 5 a 15 cm in altezza. La

**carne**

è biancastra nel cappello, rossastra alla base del gambo, soda e al taglio vira all'azzurro, con sapore molto amaro e odore di vinavil negli esemplari giovani, di aceto negli esemplari maturi.