

[Visualizza Immagine](#)

Classe ■ ■ Agaricomycetes
Ordine ■ ■ ■ ■ ■ ■ Agaricales
Famiglia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Pleurotaceae
Genere ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Hohenbuehelia
Specie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Hohenbuehelia petaloides
Sinonimo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Hohenbuehelia geogenia
Nome volgare
Commestibilità ■ ■ Commestibile, meglio se giovane

Fungo che cresce a cespi in autunno su residui legnosi interrati di latifoglie o conifere, non comune, si riconosce per lo strato gelatinoso nel cappello e le lamelle molto decorrenti. Può essere confusa con giovani esemplari apparentemente terricoli di *Pleurotus ostreatus*.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 3 e 14 cm, a forma di imbuto aperto da un lato oppure a forma di ventaglio dall'orlo ondulato. La **cuticola** liscia e pruinosa, vischiosa a tempo umido con colore ocre-camoscio o grigio-bruno.

Lamelle

fitte, molto decorrenti, bianche, poi crema.

Gambo

posto lateralmente, quando presente, duro, tenace, con colore al cappello, talvolta con peli bianchi. La

carne

è dura e coriacea, bianca con sapore e odore di farina.