

[Visualizza Immagine](#)

[Visualizza Immagine 2](#)

Classe	<i>Agaricomycetes</i>
Ordine	<i>Boletales</i>
Famiglia	<i>Boletaceae</i>
Genere	<i>Butyriboletus</i>
Specie	<i>Butyriboletus regius</i>
Sinonimo	<i>Boletus regius</i>
Nome volgare	
Commestibilità	Commestibile, ottimo

Fungo bellissimo e buon commestibile ma poco comune nei nostri boschi, più frequente nelle zone di media montagna sotto faggio e castagno, cresce in estate fino all'inizio dell'autunno. Si riconosce per il cappello rosso lampone, i pori e il gambo giallo vivo e la carne immutabile al taglio. Si può confondere con *Butyriboletus pseudoregius* (ex *Boletus pseudoregius*) che però ha un cappello rosa-brunastro e carne virante al taglio.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 20 cm, da emisferico a piano, sodo e carnoso. La **cuticola** è asciutta e vellutata, con colori che vanno dal rosa al rosso-lampone ± uniforme. **Imeno**

foro

giallo vivo tendente al verdastro in vecchiaia, non cambia colore al tocco. Il

gambo

è di colore giallo vivo ricoperto da un sottile reticolo concolore e misura dai 5 a 10 cm in altezza.

La

carne

è giallo-pallido, soda e immutabile al taglio o talvolta virante all'azzurro chiaro, con sapore e odore gradevoli.