

[Visualizza Immagine](#)

Classe Agaricomycetes

Ordine Agaricales

Famiglia Tricholomataceae

Genere Tricholoma

Specie Tricholoma sciodes

Nome volgare Falsa bigina

Commestibilità Tossico

Si tratta di una specie velenosa dall'aspetto sporco presente nei boschi di faggio dall'estate all'autunno, con una corporatura robusta, il cappello molto feltrato, l'umbone ottuso molto pronunciato, la carne con odore debole di erba e terra, il sapore amarognolo e debolmente acre. Si può confondere con *Tricholoma virgatum* che ha la cuticola più scura, l'umbone acuto e l'habitat di conifere;

bresadolatum che è più robusto e presenta squame piuttosto pronunciate sul gambo e sul pileo.

Si presenta con un **cappello** irregolarmente conico-campanulato, infine piano-convesso con marcato umbone ottuso, margine spesso ondulato, di dimensioni variabili tra 4 e 8 cm. La **cuticola**

asciutta, feltrosa e brillante di colore grigio metallico, grigio-brunastro. Le

lamelle

sono fitte, con numerose lamellule, smarginato-uncinate al gambo, ventricose, bianche o grigiastre con filo ondulato e macchiato di nerastro. Il

gambo

è cilindrico, regolare, fragile alla base, di colore bianco poi un po' grigio, a volte con sfumature rosate, leggermente forforaceo all'apice misura da 5 a 10 cm. La

carne

è bianca poi grigiasta, con leggero odore di terra o erba e sapore amarognolo, dopo lunga masticazione diventa acre.