

[Visualizza Immagine](#)

Classe Agaricomycetes
Ordine Agaricales
Famiglia Tricholomataceae
Genere Tricholoma
Specie Tricholoma sejunctum
Sinonimo Tricholoma coryphaeum
Nome volgare
Commestibilità Non Commestibile

Specie ubiquitaria che cresce in tutti gli ambienti boschivi e abbastanza comune nelle nostre zone dove si rinviene in gruppi numerosi nei boschi di latifoglie dall'estate all'autunno inoltrato. Il colore del cappello ricorda la mortale *Amanita phalloides*, pertanto è motivo sufficiente per non raccogliarlo anche se è facile verificarne le differenze girando il fungo e non trovando l'anello sul gambo e la volva alla base dello stesso.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 7 cm, da conico-convesso a appianato con umbone ottuso e orlo ondulato. La **cuticola** è liscia, vischiosa a tempo umido ma asciutta con tempo caldo, di colore che va dal verde oliva più scuro al centro per fitte fibrille radiali al giallo chiaro al margine. Le

lamelle

sono mediamente fitte, smarginate ed attaccate al gambo con uncino, bianche, con tonalità gialle sul tagliante in prossimità del bordo del cappello. Il

gambo

cilindrico, pieno, spesso ritorto e affusolato alla base, misura da 5 a 10 cm e è di colore bianco spesso macchiato da sfumature gialle. La

carne

è bianca con odore debole di farina e sapore amarognolo.