

[Visualizza Immagine](#)

□

Classe	<i>Agaricomycetes</i>
Ordine	<i>Boletales</i>
Famiglia	<i>Boletaceae</i>
Genere	<i>Boletus</i>
Specie	<i>Boletus pinophilus</i>
Nome volgare	Porcino rosso
Commestibilità	Commestibile, ottimo

Fungo poco comune nei nostri boschi mentre è diffuso in ambienti montani, da fine primavera all' autunno inoltrato sia nei boschi di conifere (pino e abete) che di latifoglie (faggi e castagni). Si riconosce per la cuticola di colore rossastro, rugosa, umida e rivestita di pruina biancastra.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 20 cm, da emisferico a piano, sodo e carnoso. La **cuticola** è untuosa, rugosa, non si scepola, con colori che vanno dal rosso cuoio al bruno-rossastro.

Imenoforo

bianco poi tende a ingiallire e divenire verdastro in vecchiaia, non cambia colore al tocco. Il

gambo

robusto e di colore da biancastro a bruno-rossastro è ornato da un sottile reticolo con colore presente solo all'apice e misura dai 5 a 12 cm in altezza. La

carne

è bianca eccetto sotto la cuticola che è in parte rossastra, soda e immutabile al taglio, con sapore dolciastro e odore debole di muschio.