

[Visualizza Immagine](#)

Classe *Agaricomycetes*
Ordine ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *Boletales*
Famiglia *Boletaceae*
Genere *Suillellus*
Specie ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ *Suillellus rhodoxanthus*
Sinonimo ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ *Boletus rhodoxanthus*
Nome volgare
Commestibilità ☐ Non commestibile per tossicità leggera ma costante

Fungo poco comune è presente nei boschi di querce e castagno dall'estate inoltrata a fine autunno. E' un bellissimo boleto a pori rosso sangue e gambo ricoperto interamente da un reticolo rosso, con carne gialla che al taglio vira all'azzurro nel cappello, mentre nel gambo rimane immutabile. Si può confondere con *Imperator rhodopurpureus* (syn. *Boletus rhodopurpureus*), che ha però tonalità rossastre nel cappello più evidenti e carne virante al blu intenso anche sul gambo.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 8 e 20 cm, da emisferico a convesso, sodo e carnoso. La **cuticola** è vellutata di colore bianco sporco con sfumatura rosa ± intensa che può invadere tutta la superficie come nell'esemplare in questione. **Imenoforo** con tubuli giallo-olivastri che virano al blu con il taglio, pori rosso sangue blu alla pressione.

Gambo

inizialmente obeso con base arrotondata, di colore giallo fittamente punteggiato di rosso e ricoperto da un fitto reticolo rosso, le zone erose rimangono giallo cromo, arriva fino a 15 cm in altezza. La

carne

è gialla, soda e al taglio vira subito al blu soltanto nel cappello e nella parte alta del gambo, con sapore e odore gradevoli.