

[Visualizza Immagine](#)

Classe	<i>Agaricomycetes</i>
Ordine	<i>Agaricales</i>
Famiglia 	<i>Fistulinaceae</i>
Genere	<i>Fistulina</i>
Specie	<i>Fistulina hepatica</i>
Nome volgare	Lingua di bue
Commestibilità	Commestibile, meglio se giovane

Specie parassita di latifoglie è abbastanza comune nei boschi di castagni dall'inizio dell'estate all'autunno. Si individua nella parte bassa della pianta ed è inconfondibile per il colore rosso e per la forma a lingua. E' un fungo ricco di vitamina C, i suoi estimatori lo preferiscono cucinato fritto in padella con le cipolle o crudo tagliato a pezzettini e mescolato con l'insalata. Può risultare indigesto.

Si presenta con una forma a mensola di dimensioni variabili tra 7 e 16 cm, con superficie liscia e lucida con l'umidità, nell'esemplare giovane si possono notare piccole gocce di liquido sul margine del cappello. Inizialmente di colore giallo-arancio poi rosso sangue. **Imenoforo** formato da piccolissimi tubuli corti separabili tra loro con pori fini giallastri che diventano bruni al tocco.

Gambo

inesistente o se presente è breve, tozzo e posto lateralmente. La

carne

è tenace, fibrosa e al taglio si notano venature più chiare. Odore poco evidente e sapore leggermente amaro.