

[Visualizza Immagine](#)

Classe *Agaricomycetes*
Ordine ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *Agaricales*
Famiglia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *Hymenogastraceae*
Genere *Hebeloma*
Specie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *Hebeloma sinapizans*
Nome volgare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **Puzzone**
Commestibilità ☐ Tossico

Specie tipicamente autunnale, si trova sempre in numerosi esemplari nei boschi di latifoglie; è facilmente riconoscibile nel suo Genere per la grande dimensione e per l'inconfondibile odore di rapa e il sapore amaro. Se abbiamo un dubbio, è sufficiente fare la sezione del gambo e osservare all'apice la presenza della carne del cappello che si insinua nel gambo formando un classico triangolo isoscele rovesciato che è asportabile. Purtroppo è responsabile della Sindrome gastroenterica e quindi va accuratamente evitato.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 15 cm, da convesso con un largo umbone ottuso a disteso, carnoso, con margine leggermente ondulato. La

cuticola

è un poco viscida con tempo umido, di colore giallastro-rossiccio tipo crosta di pane, più chiara al margine.

Lamelle

fitte, inizialmente biancastre poi bruno-cannella, mai macchiate, presenti numerose lamellule.

Gambo

di altezza tra 5 e 12cm, cilindrico, spesso con base bulbosa, sodo, di colore biancastro ricoperto da fioccosità concolori che imbruniscono al tocco. La

carne

è biancastra e soda, con forte odore di rapa e sapore amaro.