

[Visualizza Immagine](#)

Classe ☐ *Agaricomycetes*
Ordine ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *Boletales*
Famiglia *Hygrophoropsidaceae*
Genere ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *Hygrophoropsis*
Specie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *Hygrophoropsis aurantiaca*
Nome volgare ☐ ☐ ☐ Falso galletto
Commestibilità ☐ ☐ Non commestibile

Fungo abbastanza comune che cresce in estate-autunno su ceppaie marcescenti di pino, spesso su residui interrati. E' facilmente riconoscibile dal suo bel colore arancio vivo e per le lamelle profondamente decorrenti, ma il cercatore inesperto lo può confondere con *Cantharellus pallens*

(giallarella) il quale però ha colore giallo uovo uniforme, ha pseudolamelle e cresce su terreno.

Un altro fungo con cui si può confondere è il pericoloso

Omphalotus olearius

, fungo lignicolo dalle colorazioni arancio vivo, fonte di numerose e gravi intossicazioni.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 3 e 6 cm, da piano-convesso a imbutiforme, con margine involuto. La **cuticola** è vellutata, di colore giallo-arancio, più chiara al margine.

Lamelle

fitte, decorrenti, forcute verso il margine, di colore arancio.

Gambo

di altezza tra 3 e 8 cm, cilindrico, assottigliato alla base, con colore che tende a imbrunire con l'età. La

carne

è giallo-arancio, soda e fibrosa con odore di erba e sapore leggermente amaro.