

[Visualizza Immagine](#)

Classe *Agaricomycetes*
Ordine *Agaricales*
Famiglia *Cortinariaceae*
Genere *Cortinarius*
Specie *Cortinarius rufo-olivaceus*
Nome volgare
Commestibilità Non commestibile

Fungo abbastanza comune nei boschi di latifoglie dove cresce dall'inizio dell'estate all'autunno inoltrato. E facilmente riconoscibile per il colore rossastro al centro del cappello, le lamelle gialle e il bulbo marginato. La caratteristica comune a tutti i cortinari è rappresentata dai sottili filamenti simili a una ragnatela, chiamata *cortina*, che proteggendo le lamelle, si estendono dall'orlo del cappello al gambo e inoltre macchiano le mani di bruno sfregando le lamelle

Si presenta con un **cappello** da convesso a piano, di dimensioni variabili tra 5 e 10 cm. La **cuticola**

è viscosa di colore rosso vinoso al centro, grigio-violetto al margine, reazione bruno-oliva con KOH.

Lamelle

fitte, giallo-verdastre . Il

gambo

è cilindrico e robusto, biancastro-violetto e con bulbo basale nettamente marginato di colore rossastro, misura dai 4 a 10 cm in altezza. La

cortina

è visibile nella parte alta del gambo. La

carne

è soda, violetto chiaro con odore sgradevole e sapore leggermente amaro, reazione con KOH

inizialmente verde poi porpora.