

[Visualizza Immagine2](#)

[Visualizza Immagine 1](#)

Classe██████████████████ *Agaricomycetes*
Ordine ████████████████ *Agaricales*
Famiglia██████████████████ *Strophariaceae*
Genere ████████████████████ *Hypholoma*
Specie██ ████████████████████ *Hypholoma fasciculare*
Sinonimo *Psilocybe fascicularis*
Nome volgare Falso chiodino, Zolfino, Famigliola cattiva
Commestibilità ██ Tossico

Fungo comune e diffuso da Giugno a Ottobre; cresce in modo cespitoso con numerosi esemplari su vecchie ceppaie e tronchi. Il cercatore inesperto lo può scambiare per la famigliola buona *Armillaria mellea* anche se il suo sapore decisamente amaro, che si mantiene anche dopo cottura, dovrebbe indurre i commensali a non mangiarlo, ma purtroppo tutti gli anni si registrano casi di intossicazione. Il meccanismo tossicologico non è stato chiarito, ma provoca violenta gastroenterite con un periodo di latenza abbastanza lungo per il tipo di intossicazione, (5-10 ore) a cui segue un periodo di remissione e quindi insufficienza epatica severa.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 2 e 6 cm, da emisferico a convesso, infine disteso, margine incurvato talvolta con residui tipo cortina. La

cuticola

è liscia, di colore da giallo-arancio al centro a giallo –zolfo.

Lamelle

fitte e sottili, intercanalate da lamellule, inizialmente giallo-zolfo poi verde scuro.

Gambo

cilindrico, esile e ricurvo verso la base, con colore al cappello, più scuro alla base con leggera cortina nella zona anulare. La

carne

è sottile e giallastra con sapore molto amaro e odore non significativo.