

[Visualizza Immagine](#)

**Classe** ■■■■■■■■■■■■ ■ ■ *Agaricomycetes*  
**Ordine** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ *Russulales*  
**Famiglia** ■■■■■■■■■■ *Russulaceae*  
**Genere** ■■■■■■■■■■ ■ ■ *Lactarius*  
**Specie** ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ *Lactarius scrobiculatus*  
**Nome volgare**  
**Commestibilità** ■ Non commestibile

Fungo abbastanza comune in montagna sotto abete rosso (*Picea abies*). Cresce in estate-autunno a gruppi di numerosi esemplari e si individua facilmente per le enormi dimensioni che può raggiungere. La colorazione giallo cromo del cappello, il gambo decorato con i caratteristici scrobicoli gialli (fossette) e il rapido viraggio del lattice al giallo limone lo rendono facilmente riconoscibile.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 20 cm, da piano- convesso a decisamente depresso al centro, margine a lungo involuto e ricoperto da lanugine rossastra. La **cuticola**

è ± vischiosa, di colore giallo, giallo scuro, in certi casi quasi aranciato con zonature poco evidenti.

**Lamelle**

fitte, intercanalate da numerose lamellule, di colore giallo chiaro.

**Gambo**

sodo, cilindrico, presto cavo, superficie bianca, pruinosa con abbondanti scrobicoli giallo arancio. La

**carne**

è soda e bianca, al taglio diventa subito giallo limone, sapore acre, odore fruttato.

**Lattice**

abbondante, bianco, virante istantaneamente al giallo vivo, acre, reagisce in arancio al KOH.