Visualizza Immagine

Classe *Agaricomycetes*
Ordine *Russulales*
Famiglia *Russulaceae*
Genere *Lactarius*
Specie *Lactarius vellereus*
Nome volgare Lattario vellutato
Commestibilità Non commestibile per il sapore pepato

Fungo bianco molto comune, cresce in estate-autunno con preferenza nei boschi di latifoglie ma si può trovare anche sotto conifere,. Si riconosce dalle specie vicine per il latice mite che non reagisce con KOH, le lamelle più spaziate, il gambo corto e tozzo, la taglia più robusta. *Lac tarius piperatus*
ha lamelle molto fitte e latice pepato
,

Lactarius controversus
ha le lamelle rosate,
Lactarius bertillonii
si distingue per avere il latice acre che reagisce al giallo intenso con KOH.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 8 e 30 cm, da convesso a decisamente depresso al centro, margine a lungo involuto. La **cuticola** è asciutta e finemente vellutata, di colore biancastro con macchie ocracee.
Lamelle
abbastanza spaziate nell'adulto, intercanalate da numerose lamellule, di colore giallo crema macchiate di giallo-bruno.
Gambo
corto e tozzo, talvolta attenuato alla base, concolore al cappello. La
carne
è compatta, bianca, lentamente virante al crema, sapore molto acre, odore fruttato.
Latice
bianco, virante al giallognolo seccando sulle lamelle, di sapore da mite.