

[Visualizza Immagine](#)

Classe ██████████ *Agaricomycetes*
Ordine ████████ *Agaricales*
Famiglia *Omphalotaceae*
Genere ██████████ *Omphalotus*
Specie ██████████ *Omphalotus olearius*
Sinonimo ██████
Nome volgare Fungo dell'olivo
Commestibilità █████ Tossico

Fungo abbastanza diffuso, lignicolo, facilmente riconoscibile per il vistoso colore arancio del carpoforo e per le lamelle decorrenti; cresce dall'estate all'autunno nei boschi di querce e nei tronchi di olivo, spesso cespitoso ma lo si può trovare anche in esemplari singoli. (da tenere presente che i funghi lignicoli possono crescere anche su radici interrato e quindi sembrare terricoli, a un'osservazione superficiale). In Toscana è tra i funghi che causano le maggiori intossicazioni in quanto i cercatori meno esperti lo confondono con il commestibile *Cantharellus pallens* (syn. *C. cibarius*), che è un fungo terricolo e ha un imenio a pieghe. Provoca sindrome gastroenterica, con un tempo di incubazione tra 1-3 ore, causando vomito, diarrea e forti dolori addominali, associati a ipersalivazione tipo sindrome muscarinica.

Si presenta con un **Cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 15 cm, inizialmente convesso ma presto imbutiforme con margine sottile e involuto, spesso fratturato.

Cuticola

color giallo-arancio, liscia e lucida (reagisce al verde con KOH).

Lamelle

fitte e sottili, molto decorrenti, di colore giallo-arancio più chiaro del cappello, presenza di lamellule.

Gambo

cilindrico e slanciato, spesso eccentrico, attenuato alla base, fibrilloso, con colore al cappello, misura 5-14 cm.

Carne

giallastra, elastica, con odore intenso e sapore dolciastro.

