

[Visualizza Immagine](#)

Classe □ *Agaricomycetes*
Ordine *Agaricales*
Famiglia *Amanitaceae*
Genere *Amanita*
Specie *Amanita excelsa*
Sinonimo □ □ □ □ *Amanita excelsa var. spissa*
Nome volgare
Commestibilità Non commestibile

Fungo ubiquitario, cresce dall'estate all'autunno, dopo cottura sarebbe commestibile ma considerato il gusto sgradevole e la possibile confusione con la velenosa *Amanita pantherina* se ne sconsiglia il consumo.

A. pantherina

si distingue per il cappello tendente al marroncino e non al grigiastro, il margine nettamente striato, il bulbo basale più arrotondato-marginato, tipicamente circondato con cercini che si allungano sulla parte subito superiore dello stipite e per la reazione alla soda caustica nella parte superiore dell'anello che ingiallisce.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 8 e 12 cm, inizialmente globoso, poi espanso, appianato a maturità, margine perfettamente liscio, privo della caratteristica pettinatura. La **cuticola** leggermente vischiosa con tempo umido, di colore grigiastro uniforme, ricoperta da verruche bianco-grigiastre o placche farinose, talvolta assenti, disposte disordinatamente. Le **lamelle**

di colore bianco, fitte, sottili, attenuate al gambo o decorrenti con un dente, intercalate da lamellule. Il

gambo di colore biancastro, grosso, con la base leggermente allargata, napiforme e non arrossante, striato sopra l'anello, squamoso, misura da 10 ai 16 cm in altezza, con un anello biancastro, ampio, membranoso con orlo frangiato, ± persistente; alla base è presente una

volva biancastra, friabile, ridotta a tracce poco distinguibili. La

carne è bianca con odore e sapore rafanoide.