

[Visualizza Immagine](#)

Classe *Agaricomycetes*
Ordine *Agaricales*
Famiglia *Tricholomataceae*
Genere *Clitocybe*
Specie *Clitocybe alexandri*
Nome volgare
Commestibilità Commestibile di scarso valore

Fungo autunnale presente sia nei boschi di latifoglie che di conifere dove è presente un ricco substrato, spesso in piccoli gruppi. Si può confondere con *Infundibulicybe geotropa* per il cappello con un leggero umbone e le lamelle più chiare, ma l'odore di *Infundibulicybe geotropa* è inconfondibile.

Si presenta con un **cappello** carnoso, inizialmente convesso poi appianato con leggero umbone, talvolta un po' depresso al centro, margine involuto nel giovane poi ondulato, ornato solitamente da macchie più scure, di dimensioni variabili tra 4 e 10 cm. La

cuticola

è viscida a tempo umido, di colore argilla più o meno ocraceo tendente al grigio-giallastro.

Lamelle

piuttosto fitte, basse, appena decorrenti anastomosate sul gambo, colore argillaceo. Il

gambo

cilindrico, robusto, clavato verso la base che è avvolta da una lanugine cotonosa bianca, ricoperto da fibrille bianche, pieno, con colore o leggermente più chiaro del cappello, alto max 10 cm. La

carne

è biancastra, nocciola chiaro, molle, spugnosa con odore aromatico pungente simile al lucido da scarpe, che non si avverte nel fungo appena raccolto ma solo dopo diverse ore, sapore dolce o leggermente erbaceo.

