

[Visualizza Immagine](#)

Classe Agaricomycetes
Ordine Agaricales
Famiglia Agaricaceae
Genere Lycoperdon
Specie Lycoperdon pyriforme
Nome volgare vescia
Commestibilità Commestibile da giovane

Fungo di 3-5 cm. che generalmente cresce cespitoso su tronchi marcescenti e radici interrate sia di latifoglie che di conifere, in estate-autunno. Si riconosce per la sua forma a pera rovesciata, l'habitat lignicolo, l'esoperidio farinoso-granuloso e la presenza alla base di micelio rizomorfo biancastro. Fare attenzione a non respirare la gleba pulverulenta del fungo vecchio in quanto, se inalata, può provocare una bronchioalveolite acuta su base allergica chiamata "Lycoperdonosi".

Il **carpoforo** si presenta a forma di pera capovolta, leggermente umbonato alla sommità, la superficie esterna (esoperidio) è ricoperta di piccolissime verruche o granulosità di colore beige chiaro, poi brunoscuro, la superficie interna (endoperidio) è color crema e liscia; a maturità si apre un foro (ostiole) sulla sommità dal quale fuoriescono le spore; la parte inferiore è pedunculata e fissata al substrato da fini cordoni miceliari biancastri. All'interno del carpoforo la **carne (gleba)**

dapprima è bianca e compatta, poi giallastra-olivastra ed infine brunastra, la parte sterile basale del gambo

(subgleba)

rimane sempre biancastra. Da giovane ha

odore

di capra che a maturità odora di gas metano, il

sapore

è dolciastro.

