

[Visualizza Immagine](#)

Classe Agaricomycetes
Ordine Agaricales
Famiglia Hydnangiaceae
Genere Laccaria
Specie Laccaria laccata
Sinonimo
Nome volgare
Commestibilità Non commestibile

Specie ubiquitaria e gregaria abbastanza diffusa e presente dalla pianura alla montagna, cresce in tutti i tipi di boschi sia di latifolia che di conifera, dall'inizio dell'estate all'autunno fino ai primi geli; si può scambiare con numerose specie vicine differenziabili in modo sicuro solo con l'osservazione dei caratteri microscopici; infatti le caratteristiche morfocromatiche sono molto sottili tra specie diverse: *Laccaria proxima* si distingue per le colorazioni pileiche più aranciate con toni brunastri e per le evidenti striature longitudinali sul gambo;

Laccaria laccata f. *pallidofolia*

ha le lamelle più pallide;

Laccaria tortilis

si riconosce per le dimensioni più piccole, il cappello irregolare e profondamente striato, le lamelle spesso anastomizzate;

Laccaria fraterna

è di piccole dimensioni, i colori accesi rosso-brunastri e la preferenza presso Eucalipto;

Laccaria bicolor

si distingue per le lamelle e i resti miceliari alla base del gambo di colore violetto-lilacino.

Si presenta con un **Cappello** di dimensioni variabili tra da 1 a 5 cm, inizialmente convesso per poi appiattirsi in età adulta con la presenza di una piccola depressione centrale, il margine è striato per trasparenza, spesso ondulato e costolato.

Cuticola

opaca, leggermente feltrata e forforacea verso il centro, colore dal rosa carnicino al rosso-brunastro pallido che in relazione al tempo scurisce con l'umidità e sbiadisce fino al beige chiaro con il tempo secco.

Lamelle

da adnate a subdecorrenti, spaziate, larghe, intercalate da numerose lamellule, fragili e facilmente asportabili, di colore rosa molto chiaro in gioventù, rosa con riflessi viola durante lo sviluppo infine rosa-brunastro in età adulta con filo concolore.

Gambo

cilindrico, più o meno slanciato, talvolta

contorto e allargato verso la base, elastico, fibroso, concolore al cappello o più scuro con l'età, liscio o striato in senso longitudinale per la presenza di piccole fibrille, micelio basale biancastro, misura 3-10 cm.

Carne

esigua nel cappello e fibrosa nel gambo, igrofana, rosata, di sapore dolciastro e odore gradevole.