

[Visualizza Immagine](#)

Classe Agaricomycetes
Ordine Agaricales
Famiglia Hygrophoraceae
Genere Hygrophorus
Specie Hygrophorus persoonii
Sinonimo [Hygrophorus dichrous var fuscovinosus](#)
Nome volgare
Commestibilità Commestibile

Specie non comune che cresce in colonie di numerosi individui talora concresciuti nel tardo autunno nei boschi di latifoglie, soprattutto leccio (*Quercus ilex*); si tratta di un discreto fungo commestibile, ma poco considerato a causa della sua viscosità. Si può confondere con altre specie simili che però si associano in habitat diversi e hanno diversa reazione al NaOH (Idrossido di Sodio): *Hygrophorus olivaceoalbus*
Hygrophorus latitabundus sotto abete rosso (*Picea abies*) e rosso-arancio nel gambo, Pino (*Pinus nigra*) o *Pinus pinea* e giallo-ocraceo nel gambo. Mentre *Hygrophorus persoonii* blu-verde sul cappello.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 3 e 8 cm, inizialmente emisferico poi convesso-espanso con umbone centrale ottuso, margine inizialmente involuto e chiuso sul gambo, poi espanso. La **cuticola** è glutinosa, liscia, fibrillosa e striata, color bruno, grigio-olivastro che, con l'età, tende a schiarirsi verso il margine, il glutine reagisce al blu-verdastro in presenza di ammoniaca o idrossido di potassio.

Lamelle

spaziate, da adnate a subdecorrenti, arcuate, ceracee, di colore biancastro con sfumature carnicino-olivastro.

Gambo

cilindrico, pieno, slanciato ma attenuato alla base, spesso macchiata di giallo ruggine, a volte subradicante; la superficie, dalla base fino a circa 1 cm dall'apice, è ricoperta da uno spesso glutine decorato da bande bruno-olivastre concolori al cappello, la parte al di sopra, delimitata da uno pseudoanello, appare assottigliata, bianca e asciutta. La

carne

è bianca, soda, compatta in gioventù, poi diventa leggermente spugnosa e un po' fibrosa nel gambo, con debole

odore

indefinito e

sapore

tenue.