

[Visualizza Immagine](#)

Classe *Agaricomycetes*
Ordine *Agaricales*
Famiglia *Hygrophoraceae*
Genere *Hygrophorus*
Specie *Hygrophorus arbustivus*
Sinonimo *Hygrophorus arbustivus var. quercetorum*
Nome volgare
Commestibilità ☐ ☐ Commestibile

Specie autunnale presente nei nostri boschi di latifoglie (querce e faggi) singolo o a gruppi di numerosi individui. Macroscopicamente si riconosce per avere le fibrille, visibili ad occhio nudo, che dal disco centrale vanno verso il margine del cappello e per il colore molto chiaro di gambo e lamelle che contrasta con quello fortemente colorato della parte centrale del cappello.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 3 e 7 cm, inizialmente emisferico-campanulato, poi piano-convesso con basso umbone ottuso. La

cuticola

è viscida con tempo umido e molto asciutta da secco, color beige-crema con sfumature aranciate chiaro al margine e più scura al centro, interamente ricoperta con fibrille ocraceo-rugginose innate, poste radialmente e molto evidenti.

Lamelle

spaziate, adnate-decorrenti per un dentino, ventricose, lardacee, con lamellule, di colore bianco, bianco-crema con qualche tonalità rosacea sul fondo.

Gambo

cilindrico, attenuato alla base, abbastanza consistente, con superficie pruinosa più evidente all'apice, di colore bianco dalla metà verso l'alto, bianco-ocraceo verso il basso. La

carne

è biancastra, compatta, un po' fibrosa, piuttosto sottile verso il margine con

odore

e

sapore

non evidenti.