

[Visualizza Immagine](#)

Classe *Agaricomycetes*
Ordine *Agaricales*
Famiglia □□□□□□□□□□□□□□ *Hygrophoraceae*
Genere □□□□□□□□□□□□□□ *Hygrophorus*
Specie □□□□□□□□□□□□□□ *Hygrophorus agathosmus*
Sinonimo
Nome volgare
Commestibilità □□ Non Commestibile

Specie che cresce dall'estate all'autunno soprattutto nelle radure e lungo il margine dei boschi di conifere, dove risulta abbastanza comune e abbondante. E' facilmente riconoscibile per il colore grigio del cappello ma soprattutto per il caratteristico odore di mandorle amare che ricorda la coccoina. Si può confondere con altre specie simili: *Hygrophorus hyacinthinus* che presenta colorazioni più pallide e lamelle con riflessi rosati;
Hygrophorus odoratus
è piccolino, con cappello che misura al massimo 2,5 cm e lamelle giallastro-rosate;
Hygrophorus agathosmus
fo.
aureo-floccosus
che si differenzia dal tipus soltanto per le numerose granulazioni giallo-dorate, poste nella parte alta del gambo.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 3 e 8 cm, inizialmente emisferico, poi convesso-campanulato, in seguito appianato con largo umbone, il margine è poco eccedente, involuto, lobato, poi disteso, di colore più chiaro rispetto al resto del cappello. La

cuticola

è liscia, umida, vischiosa, con varie tonalità di grigio, fino a grigio-ocra, più scura al centro.

Lamelle

spaziate, da adnate a subdecorrenti, larghe, sinuose, spesse e lardacee, con numerose lamellule, di colore bianco-grigio, con qualche alone o macchia giallastro-verdognola.

Gambo

sodo, pieno, cilindrico, slanciato ma attenuato alla base, bianco e poi grigiastro, leggermente ocraceo verso la base, con granulazioni furfuracee all'apice. La

carne

è bianca, spessa al centro e di consistenza compatta, dura e fibrosa nel gambo, sotto la

cuticola è grigia e viene rapidamente invasa da vermi, con

odore

di mandorle amare e

sapore

gradevole.