

[Visualizza Immagine](#)

Classe *Agaricomycetes*
Ordine *Russulales*
Famiglia *Stereaceae*
Genere *Stereum*
Specie *Stereum gausapatum*
Nome volgare
Commestibilità Non commestibile

Specie perenne e abbastanza comune che cresce su latifoglie, in particolare rami secchi di *Quercus*

. Fungo che si fa identificare per la sua colorazione rosso scura e per la caratteristica di secernere un liquido di colore rosso scuro, graffiando la superficie imeniale. Altra specie simile con la caratteristica dell'arrossamento è

Stereum sanguinolentum

(Alb. e Schwein.)Fr., che però cresce su legno di conifere.

Si presenta solitamente raggruppato in vari individui con un **carpoforo** da resupinato ad effuso riflesso, talvolta brevemente stipitato con la superficie superiore ondulata, feltrata irsuta, rosso scuro, bruno ruggine.

margin

sottile, increspato, ondulato, di colore biancastro, giallo-crema.

imenoforo

liscio, ondulato, da arancio-marrone a giallo-marrone o giallo, arrossante allo sfregamento negli esemplari freschi e con tempo umido, sporata biancastra. La

carne

è sottile, dura, tenace, biancastra, priva di

Odore e Sapore

.